



POST INFUSION DISCHARGE INSTRUCTIONS

If your child has as a Port, PICC or Broviac AND a temperature of >100.4, please call the clinic ASAP

If you have any questions or concerns within the next 24 hours, please call our office - **702.732.1493**

If you experience trouble breathing, gray or bluish skin color, or unable to wake child - **Call 911 IMMEDIATELY.**

Your child's infusion is complete.

Your child is now ready to go home.

Please read and follow the guidelines below upon discharge.

If the patient has an implanted port or had an IV:

- Dressing over port or IV site should be dry (without bleeding or drainage) and intact upon discharge.
- Check the site for redness, pain, drainage, bleeding or blisters for 3 days after infusion.
- Report any of the above to office/provider.
- Take dressing off within an hour.

If the patient is discharged with port needle and/or IV catheter in place:

- Keep dressing dry and intact. No bathing, showering or swimming while needle is in place.
- Do not allow your child to pull on the needle/catheter/dressing (bandage).
- If an arm board is needed to help protect the IV site leave it in place.
- If IV tubing becomes disconnected and bleeding occurs, place direct pressure on site to stop bleeding.
- Call office/provider immediately.

If your child complains of nausea/vomiting:

- Administer anti-nausea medications as ordered.
- If your child continues to vomit after discharge, please call office/provider.

Activity

- Your child may return to normal activity as tolerated.

Sleep

- Your child may be tired/sleepy after returning home.
- Check your child frequently to make sure he or she is breathing easily and has not vomited.
- Place child on his or her side during sleep.
- Your child may be fussy or very active (hyperactive) after infusion.

Please refer to specific medication information sheets for list of drug complications - Ask an RN for a copy.

You and your child should know the names of all the medicines he or she is taking. Share this information with anyone involved in your child's care.

Patient's Name

Date

Representative Name/Relationship to Patient

Signature



INSTRUCCIONES DE ALTA POSINFUSIÓN

Si su hijo tiene un Port, PICC o Broviac Y una temperatura de >100.4, llame a la clínica lo antes posible.

Si usted tiene cualquier pregunta o duda dentro las próximas 24 horas, por favor llame a nuestra oficina - **702.732.1493**

Si experimenta dificultad para respirar, color de piel gris o azulado, o no puede despertar al niño - llame al **911**

INMEDIATAMENTE.

La infusión de su hijo está completa.

Su hijo ahora está listo para ir a casa.

Por favor, lea y siga las pautas a continuación al momento del alta:

Si el paciente tiene un puerto de acceso implantado o tuvo una vía intravenosa

- El vendaje sobre el sitio del puerto de acceso o de la vía intravenosa debería estar seco (sin sangramiento o drenaje) e intacto al ser dado de alta.
- Revise el sitio en busca de enrojecimiento, dolor, drenaje, sangramiento o de ampollas durante 3 días después de la infusión.
- Reporte cualquiera de los anteriores a la oficina/al proveedor.
- Quítese el vendaje dentro de una hora.

Si el paciente es dado de alta con la aguja del puerto de acceso y/o el catéter intravenoso colocado:

- Mantenga el vendaje seco e intacto. No bañarse, ducharse o nadar mientras la aguja esté colocada.
- No permita que su hijo jale la aguja/ el catéter / el vendaje.
- Si se requiere una tablilla para proteger el sitio de la vía intravenosa manténgalo colocado.
- Si el tubo intravenoso se desconecta y ocurre sangramiento, ponga presión directa sobre el sitio para parar el sangrado.
- Llame a la oficina / al proveedor inmediatamente.

Si su hijo se queja de náuseas/vómitos:

- Administre los medicamentos contra las náuseas según lo ordenado.
- Si su hijo continua a vomitar después de darle de alta, por favor llame a la oficina / al proveedor.

Actividad

- Su hijo puede regresar a la actividad normal según tolerado.

Sueño

- Su hijo podrá estar cansado / somnoliento después de regresar a casa.
- Revise a su hijo frecuentemente para asegurarse de que esté respirando con facilidad y que no haiga vomitado.
- Coloque a su hijo de lado mientras que duerma.
- Su hijo puede ser exigente o muy activo (hiperactivo) después de la infusión.

Por favor consulte las hojas de información de medicamentos específicos para obtener una lista de las complicaciones de los medicamentos - Pida una copia a una enfermera registrada.

Usted y su hijo deben saber los nombres de todos los medicamentos que esté tomando. Comparte esta información con cualquier persona involucrada con el cuidado de su hijo.

Nombre del paciente

Fecha

Nombre del representante/relación con el paciente

Firma